

Hypoxic liver perfusion with mitomycin-C for treating multifocal metastases and unresectable primary tumours: a single-centre series of 42 patients

Infusione intra-arteriosa epatica in ipossia di mitomicina-C per il trattamento di metastasi epatiche multiple e di tumori primitivi inoperabili: esperienza mono-centrica in 42 pazienti

**A. Baggiani¹ • A.M. Ierardi² • B. Caspani² • F. Motta² • D. Toniolo¹ • P. Belloni¹ • E. Setola¹
E. Campagnoli¹ • S. Tempini³ • R. Crocchiolo⁴ • M. Bregni¹ • L. Belli²**

¹U.O. Oncologia Medica, Ospedale San Giuseppe, Via San Vittore 12, 20123 Milano, Italy

²U.O. Radiologia, Ospedale San Giuseppe, Via San Vittore 12, 20123 Milano, Italy

³U.O. Gastroenterologia, Ospedale San Giuseppe, Via San Vittore 12, 20123 Milano, Italy

⁴Univesità degli Studi di Genova, Genova, Italy

Correspondence to: A. Ierardi, Tel.: +39-02-85994827; Fax: +39-02-85994800; e-mail: amierardi@yahoo.it

Received: 25 October 2010 / Accepted: 15 December 2010 / Published online: 4 September 2011

© Springer-Verlag 2011

Erratum to: La radiol med DOI 10.1007/s11547-011-0724-3

The original version of this article, unfortunately, contained a mistake. The name of the first author should have been A. Bagliani instead of A. Baggiani

Nella versione originale di questo articolo era contenuto un refuso accidentale.

Il nome del primo autore avrebbe dovuto essere A. Bagliani anziché A. Baggiani.

The online version of the original article can be found at
<http://dx.doi.org/10.1007/s11547-011-0724-3>.
