

# Inhaltsverzeichnis.

	Seite
Vorwort . . . . .	3
Einleitung . . . . .	5
A. Die Fichtenwälder . . . . .	6
a) Die bodentrockenen Fichtenwälder . . . . .	9
I. Gruppe der bodentrockenen Fichtenwälder, die basische Böden besiedeln (PICEETUM basiferens) . . . . .	9
Bodenbasischer Fichtenwald, im Latschenbuschwald hochgekommen . . . . .	11
Bodenbasischer Fichtenwald, im Zirbenwald hochgekommen . . . . .	16
Bodenbasischer Fichtenwald, im Lärchenwald hochgekommen . . . . .	21
a) Buntreitgras-reicher Fichtenwald, im bodenbasischen Lärchenwald aufgekommen . . . . .	21
b) Weißseggen-reicher Fichtenwald, im bodenbasischen Lärchenwald aufgekommen, in Entwicklung zum Rotbuchen-Tannenwald . . . . .	23
c) Sanikel-reicher Fichtenwald, im bodenbasischen Lärchenwald aufgekommen, in Ent- wicklung zum Rotbuchen-Tannenwald . . . . .	26
Bodenbasischer Fichtenwald, im Rotföhrenwald hochgekommen . . . . .	28
a) Wimper-Alpenrosenreicher Fichtenwald, im bodenbasischen Rotföhrenwald hoch- gekommen, in Entwicklung zum Rotbuchenwald . . . . .	29
b) Rotföhren-Fichten-Mischwald im Erica-carnea-reichen Rotföhrenwald sekundär auf- gekommen, in Entwicklung zum Rotbuchen-Tannenwald . . . . .	32
Bodenbasischer Fichtenwald, im Engadiner Rotföhrenwald aufgekommen . . . . .	35
Bodenbasischer Fichtenwald, im Schwarzföhrenwald hochgekommen . . . . .	36
II. Gruppe der bodentrockenen Fichtenwälder, die saure Böden besiedeln (PICEETUM acidiferens) . . . . .	38
Bodensaurer Fichtenwald, im bodensauren Latschenbuschwald über Kalkboden hoch- gekommen . . . . .	41
Bodensaurer Fichtenwald, im bodensauren Zirbenwald hochgekommen . . . . .	45
Bodensaurer Fichtenwald, im bodensauren Lärchenwald aufgekommen . . . . .	50
Bodensaurer Fichtenwald, im bodensauren Lärchenwald aufgekommen, in Entwicklung zum Rotbuchen-Tannenwald . . . . .	58
Bodensaurer Fichtenwald, im bodensauren Stieleichen-Rotföhrenwald aufgekommen, in Entwicklung zum Rotbuchenwald . . . . .	65
Bodensaurer Fichtenwald, im bodensauren Grünerlenwald hochgekommen . . . . .	74
Bodensaurer Fichtenwald, im Ebereschenwald hochgekommen . . . . .	78
Bodensaurer Fichtenwald, im Ebereschen-Vorwald hochgekommen, sich zum Fichten- Bergahorn-Mischwald entwickelnd . . . . .	90
Bodensaurer Fichtenwald, im Ebereschen-Vorwald hochgekommen, sich zum Fichten- Bergahorn-Rotbuchenwald entwickelnd . . . . .	95
b) Die bodenfeuchten Fichtenwälder . . . . .	97
III. Gruppe der Fichtenwälder feuchter, nährstoffreicher Böden (PICEETUM hygroferens) . . . . .	97
Die Grauerlen-Fichtenwälder im allgemeinen . . . . .	99
Fichtenwald, im Grauerlen-Auenwald hochgekommen . . . . .	100
Fichtenwald, im Grauerlen-Unterhangwald aufgekommen . . . . .	111
Fichtenwald, im Schwarzerlen-Auenwald hochgekommen . . . . .	122
Fichtenwald, im Schwarzerlen-Unterhangwald hochgekommen . . . . .	124
Fichtenwald, im Schwarzerlen-Bruchwald hochgekommen . . . . .	131
IV. Gruppe der Hochmoor-Fichtenwälder, die feuchte, nährstoff- arme Böden besiedeln (PICEETUM turfosum) . . . . .	139
B. Die Fichtenforste und ihre Überführung in naturnahe Wirtschaftswälder . . . . .	152